

F
A
C
C
C



Guide pratique des

1^{ers} SECOURS CANINS



Avertissement	p.02
Numéros d'urgence	p.03
Renseigner et attendre les secours	p.04
Trousse de secours	p.05
Sac à dos d'urgence	p.06

Arrêt cardiaque	p.08
Chenilles processionnaires	p.11
Coup de chaud	p.13
Dilatation/ torsion d'estomac	p.15
Etat de choc	p.16
Eventration	p.19
Hémorragie interne	p.21
Hypoglycémie	p.23
Membre fracturé	p.25
Morsure de serpent	p.28
Plaie	p.30
Plaie hémorragique	p.32
Pneumothorax	p.35
Problème oculaire	p.37

Transporter un chien blessé	p.39
Improviser un brancard	p.40
Improviser une muselière	p.41
Bon à savoir et à faire	p.42



Ce guide pratique des premiers secours canins a pour but de vous fournir des conseils permettant de stabiliser le chien en situation d'urgence, afin de permettre son transport chez le vétérinaire et d'éviter une aggravation de son état.

Les conseils fournis ne peuvent en aucun cas se substituer aux soins dispensés par un professionnel de médecine vétérinaire.

Nous tenons tout particulièrement à remercier les docteurs vétérinaires qui ont aimablement apporté leur contribution à la rédaction de ce document, ainsi que nos annonceurs pour leur soutien financier à ce projet.



NUMÉROS D'URGENCE

Vétérinaire 1

Commune :

Téléphone :

Vétérinaire 2

Commune :

Téléphone :



Pas de réseau mobile ? Sur votre portable, appuyez sur **URGENCE** en bas de votre écran. Vous pourrez peut-être capter un autre opérateur qui prendra le relais.

112

URGENCES
NUMERO UNIQUE

114

URGENCES
SOURDS &
MALENTENDANTS

3115

URGENCES
VÉTÉRINAIRES



1/ SE LOCALISER

En cas d'accident, sans aucune possibilité de vous repérer géographiquement, après avoir fait le 112, les secours vous enverront un SMS auquel vous répondrez. Ils pourront ainsi vous localiser.

Vous pouvez aussi vous servir de votre mobile (Google maps ou application similaire) ou de votre appareil de repérage pour trouver vos coordonnées GPS et les communiquer aux services de secours.

2/ PATIENTER

Le matériel emporté dans votre sac à dos pourra vous aider à attendre les secours : couverture de survie, briquet (si les conditions de sécheresse et le biotope permettent d'allumer un feu), bandes pour couvrir les plaies, pansements compressifs et corde pour contenir une hémorragie...

Pensez aussi à mettre votre portable au chaud et à diminuer au maximum toutes ses fonctions sans l'éteindre évidemment. Méfiez-vous de la fonction vibreur (vous pourriez ne pas l'entendre sonner).



Serrez-vous contre votre chien pour limiter les déperditions de chaleur et calmer votre angoisse en attendant les secours.



La trousse de secours doit être en permanence dans votre véhicule de chasse.

Elle comporte :

- des compresses stériles,
- 1 pansement compressif mousse,
- 1 antiseptique iodé ou chlorhexidine,
- 1 solution lavante (savon liquide),
- 1 bande auto-agrippante,
- 1 bande velpeau,
- 1 poche de froid instantané,
- 1 pince hémostatique,
- 1 agrafeuse (optionnel),
- 1 paire de ciseaux,
- 1 thermomètre,
- 1 pince pour retirer les tiques,
- 1 sangle fine pour faire une muselière ou un garrot,
- 1 couteau,
- des gants vinyle,
- du sparadrap ou du ruban adhésif,
- 1 tour de cou,
- 1 couverture de survie (épaisse),
- 1 serviette de toilette ou un carré de tissu de 1m x 1m,
- 1 collerette,
- 2 attelles.



SAC À DOS D'URGENCE

Destiné aux traqueurs, le sac à dos d'urgence contient le nécessaire pour traiter les pathologies sur le terrain.

Il comporte :

- 1 bande biflex numéro 9, ①
- 1 sparadrap ou de l'adhésif largeur 10 cm, ②
- 1 bandana ou un tour de cou (pneumothorax), ③
- 1 couverture de survie épaisse, ④
- 1 lampe frontale, ⑤
- 1 bande velpeau de 20 cm de largeur, ⑥
- 1 corde fine et résistante (garrot), ⑦
- du sparadrap ou du ruban adhésif, ⑧
- 1 briquet, ⑨
- 1 pansement compressif mousse, ⑩
- 1 serviette de toilette ou carré de tissu de 1m x 1m (plaie béante ou éventration), ⑪
- 1 bougie chauffe-plat. ⑫

Pour bien l'emballer :

- ▶ Disposez le matériel 1 à 9 dans le carré de toile,
- ▶ Pliez pour former un rectangle de 40x30 cm (ép. 8 cm),
- ▶ Renforcez le paquetage avec du ruban adhésif,
- ▶ Mettez le tout dans un sac à dos (22 litres),
- ▶ Positionnez-le bien à plat côté dos afin de réserver la place aux autres objets qui vous seront utiles (eau, nourriture, laines et coupe-vent).





SYMPTÔMES / DESCRIPTION

Le chien est inconscient et ne bouge plus, ceci même si vous le sollicitez (tapez des mains, appelez-le par son nom...), le frictionnez ou lui donnez de petites tapes.

Pour vérifier qu'un chien se trouve bien en situation d'arrêt cardiaque :

- ▶ Placez l'animal sur le côté droit,
- ▶ Enlevez-lui son collier,
- ▶ Placez sa tête et son cou dans l'alignement de la colonne afin de favoriser la circulation d'air,
- ▶ Ouvrez-lui la gueule, tirez sa langue et dégagez sa gorge de tout ce qui peut gêner la respiration (objet, glaire...).

VÉRIFIER LES BATTEMENTS DU COEUR :

- ▶ Prenez le pouls à l'intérieur de la cuisse comme sur la photographie ci-contre :



TESTER LA RESPIRATION :

- ▶ Placez les mains autour du museau du chien et avancez la joue près de sa gueule : si on ne sent pas d'air en sortir, c'est que le chien ne respire plus.



LES BONS GESTES

Si le chien ne respire pas et que son cœur ne bat plus, il faut entamer le processus de réanimation cardio-respiratoire :

- ▶ Repérez l'endroit où le coude du chien (l'articulation de sa patte avant) touche son poitrail,
- ▶ Utilisez cet endroit comme repère pour effectuer le massage cardiaque,
- ▶ Effectuez 30 compressions rapides et régulières.



Pour un chien de grande taille, placez les deux mains l'une sur l'autre ;

Pour un chien de petite taille, n'utilisez que le bas de la paume de la main.

► Puis administrez 2 respirations artificielles au chien (bouche à truffe) :

- 1 Fermez la gueule du chien,
- 2 Abaissez les babines,
- 3 Extériorisez, si possible, la langue,
- 4 Entourez le museau avec les mains en laissant la truffe découverte,
- 5 Soufflez dans la truffe jusqu'à ce que la poitrine se soulève.



Vérifiez toutes les 2 minutes si le chien a repris sa respiration.

Dans le cas contraire, il faut continuer la respiration artificielle et le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée au cabinet vétérinaire.





SYMPTÔMES / DESCRIPTION

Le contact des poils de la chenille processionnaire avec la peau du chien provoque une réaction violente, presque immédiate et comparable à une réaction allergique.

Les poils de cette chenille sont extrêmement venimeux et provoquent :

- ▶ de fortes douleurs,
- ▶ des inflammations, des brûlures (nécrose),
- ▶ des œdèmes, rougeurs jusqu'au choc anaphylactique pouvant entraîner la mort par manque de respiration.

De façon quasi systématique, le chien va tenter de se débarrasser de ces poils en se léchant.

Cette action a pour effet d'infecter sa langue !

Le chien se met alors à frotter sa gueule pour manifester sa gêne.





MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ▶ Un bidon d'eau,
- ▶ Une paire de gants,
- ▶ Du bicarbonate de sodium.



LES BONS GESTES

- ▶ Empêchez le chien de se gratter, ce qui aggraverait la situation,
- ▶ Rincez abondamment la tête et la bouche du chien avec un mélange eau/bicarbonate pour essayer d'éliminer les poils urticants.

**APPELEZ D'URGENCE
VOTRE VÉTÉRINAIRE
N'ATTENDEZ PAS !**



LES GESTES À ÉVITER !

- ▶ Rentrer en contact avec les poils urticants de la chenille qui sont également très dangereux pour l'homme !



SYMPTÔMES / DESCRIPTION

- ▶ Température supérieure à 40°/40.5°C,



La température corporelle normale du chien se situe entre 38 et 39°C

- ▶ Halètement marqué,
- ▶ Le chien cherche un endroit frais, salive, a une démarche nonchalante, parfois de la diarrhée.

Dans les cas les plus graves :

- ▶ Possibilité de vomissements,
- ▶ Tremblements pouvant aller jusqu'à la perte de connaissance.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ▶ De l'eau fraîche (mais pas glacée),
- ▶ Une poche de froid,
- ▶ Une gamelle,
- ▶ Un thermomètre.





LES BONS GESTES

- ▶ Vérifiez la température à l'aide du thermomètre,
- ▶ Placez le chien dans un endroit frais et bien ventilé, à l'ombre,
- ▶ Arrosez-le progressivement des pattes arrières jusqu'à la tête pendant au moins 10 minutes,
- ▶ Mettez une poche de froid entre ses pattes arrières pour qu'il se refroidisse plus rapidement (passage de l'artère fémorale),
- ▶ Faites-lui boire de l'eau fraîche.



LES GESTES À ÉVITER !

- ▶ « Jeter le chien » dans une mare ou utiliser de l'eau glacée : risque de choc thermique !



La baisse de température est longue à se mettre en place mais peut se produire d'un coup !
Arrêtez les soins dès le retour à 39°C :
risque d'hypothermie !



Si le chien ne récupère pas dans les 10 minutes, conduisez-le chez le vétérinaire car le coup de chaleur s'accompagne parfois de phénomènes de déshydratation que l'animal n'arrive pas à compenser.



SYMPTÔMES / DESCRIPTION

- ▶ Respiration difficile (rapide, haletante),
- ▶ Agitation, plaintes, refus de s'allonger (dû aux douleurs abdominales),
- ▶ Abdomen gonflé,
- ▶ Rythme cardiaque élevé,
- ▶ Le chien bave et essaie de vomir sans y parvenir.



Le chien peut mourir en très peu de temps

**APPELEZ
D'URGENCE VOTRE
VÉTÉRINAIRE
N'ATTENDEZ PAS !**



ÉTAT DE CHOC

Le terme de « choc » est souvent utilisé et rarement à bon escient : il s'agit en fait d'un état beaucoup plus grave que le léger sentiment de malaise ressenti après un accident bénin ou une frayeur que l'on appelle souvent « choc ».

Il peut avoir pour origine :

- ▶ un trauma (hémorragie, atteinte neurologique...),
- ▶ une maladie cardio-vasculaire (affection grave du myocarde...),
- ▶ une septicémie (infection généralisée),
- ▶ un choc anaphylactique,
- ▶ ou encore une perte excessive de fluide consécutive à des diarrhées ou vomissements importants.



Un choc se traduit par une circulation sanguine insuffisante qui peut entraîner la mort !



SYMPTÔMES / DESCRIPTION

- ▶ Faiblesse, léthargie,
- ▶ Mouvements neurologiques convulsifs,
- ▶ Prostration intense,
- ▶ Altération de la conscience, voire perte de connaissance,
- ▶ Pâleur des muqueuses de la bouche (gencives) et des babines,
- ▶ Pâleur de la conjonctive des yeux,
- ▶ Décoloration de la peau,
- ▶ Pouls plus rapide mais plus faible,
- ▶ Respiration rapide,
- ▶ Regard fixe et pupilles dilatées,
- ▶ Extrémités des membres froids,
- ▶ Parfois une hypothermie, c'est-à-dire une température rectale inférieure à 38°C.



La persistance de ces symptômes peut rapidement entraîner la mort de l'animal par défaillance de tous les organes.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ▶ Une couverture de survie.

**APPELEZ D'URGENCE
VOTRE VÉTÉRINAIRE
N'ATTENDEZ PAS !**



LES BONS GESTES

- ▶ Enveloppez le chien dans une couverture pour le réchauffer,
- ▶ S'il est inconscient, maintenez-lui la tête à la hauteur du reste du corps ou plus bas que le corps,
- ▶ Recouvrez les éventuelles plaies importantes avec un linge humide propre,
- ▶ En cas d'hémorragie, faites une compression,
- ▶ Massez les membres et les muscles pour activer la circulation sanguine,
- ▶ S'il est conscient et qu'il ne vomit pas, essayez de donner de l'eau sucrée au chien,
- ▶ Prenez son pouls et mesurez sa fréquence respiratoire toutes les demi-heures (notez ces informations pour le vétérinaire),
- ▶ Faites éventuellement un massage cardiaque si le chien ne semble plus respirer (*voir pages 10 - 11*).



LES GESTES À ÉVITER !

- ▶ S'il est inconscient, qu'il a des crampes ou qu'il vomit, ne jamais administrer à un chien quelque chose par la bouche !



SYMPTÔMES / DESCRIPTION

- ▶ La masse viscérale est en dehors de l'abdomen et pend sous le chien ou sur le côté,
- ▶ Le chien est plus ou moins épuisé,
- ▶ Il n'a pas conscience de la gravité de son état, il peut continuer à se mouvoir et se vider ainsi, en s'accrochant aux broussailles,
- ▶ La douleur n'est pas intense, il est en état de choc plus ou moins important.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ▶ Un morceau de tissu de 50 x 100 cm environ, linge propre, plié en carré,
- ▶ Une bande large,
- ▶ Une serviette propre ou un bandana style cache-col ou une veste,
- ▶ Du ruban adhésif ou du sparadrap ou une bande auto-agrippante,
- ▶ Du sérum physiologique.





LES BONS GESTES

- ▶ Retirez sommairement les végétaux accrochés aux organes puis rincez à l'eau claire ou au sérum physiologique,
- ▶ Entourez, sans les rentrer dans le ventre, les organes avec le carré de linge humidifié (si possible avec du sérum physiologique), ne touchez pas le linge en contact avec la plaie et ne comprimez pas trop,
- ▶ Faites des tours avec la bande et maintenez-la avec de l'adhésif,
- ▶ Portez le chien si vous en avez la capacité physique (sinon, servez-vous d'une veste comme d'un traîneau, le chien à l'intérieur, fermeture éclair bouclée).



Malgré le stress, prenez votre temps pour l'emballage du chien.



Les organes sont très fluides et les secousses de votre marche (ou du véhicule) peuvent aggraver l'état du chien : calez-le sur le siège passager avec des sacs, des vêtements ou autres et immobilisez-le le plus possible.

HÉMORRAGIE INTERNE



SYMPTÔMES / DESCRIPTION

- ▶ Epanchement de sang à l'intérieur de l'organisme qui peut sortir par un orifice naturel (oreille, nez, gueule...).



Une hémorragie interne peut n'avoir aucun symptôme visible dans les premières heures. Méfiez-vous de tout comportement anormal du chien, surtout en cas de suspicion de choc.



Dans ce genre de situation, il est difficile d'identifier l'origine du saignement et donc d'agir efficacement. En effet, les origines de ce type d'hémorragie peuvent être diverses et variées.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ▶ Une couverture de survie.



LES BONS GESTES

- ▶ Laissez le sang s'écouler à l'extérieur,
- ▶ Couvrez l'animal à l'aide d'une couverture de survie,
- ▶ Gardez au calme le chien en limitant au maximum ses mouvements.



LES GESTES À ÉVITER !

- ▶ Attendre : il s'agit d'une urgence vitale, appelez d'urgence un vétérinaire et emmenez-lui le chien le plus rapidement possible !
- ▶ Donner à manger ou à boire au chien.



Peu importe son origine, ce type de saignement peut être le signe d'un traumatisme ou d'une maladie qu'il faudra traiter en urgence.





SYMPTÔMES / DESCRIPTION

Une crise d'hypoglycémie est souvent brutale et peut avoir de graves conséquences.

Les symptômes sont, dans l'ordre d'apparition :

- ▶ Faiblesse, fatigue,
- ▶ Tremblements,
- ▶ Démarche vacillante, perte d'équilibre, chutes,
- ▶ Désorientation,
- ▶ Anxiété,
- ▶ Crises convulsives,
- ▶ Perte de conscience,
- ▶ Dans les cas les plus graves, coma pouvant conduire à la mort.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ▶ Du miel liquide,
- ▶ Des sucres,
- ▶ De l'eau,
- ▶ Des gâteaux ou d'autres aliments sucrés.





LES BONS GESTES

Si le chien peut manger seul :

- ▶ Donnez une friandise sucrée, une pâte de fruits, un gâteau...



Si le chien est trop faible :

- ▶ Donnez un aliment sucré liquide (eau sucrée, miel) en quantité suffisante (environ 1 cuillère à café pour 5 kg) à répartir sur les gencives de l'animal.



Si le chien convulse, ne mettez pas vos mains dans sa gueule au risque de vous faire mordre, mais faites couler le liquide dans celle-ci, plusieurs fois, en petite quantité.

Le sucre va être absorbé par les muqueuses buccales sans qu'il ait besoin d'être avalé.

Si le chien est ensuite capable de manger :

- ▶ Donnez un petit repas.

**SI LES SYMPTÔMES PERSISTENT,
APPELEZ D'URGENCE VOTRE
VÉTÉRINAIRE !**



SYMPTÔMES / DESCRIPTION

Fracture ouverte :

- ▶ Plaie plus ou moins importante,
- ▶ Os visible et « cassé ».

Fracture fermée :

- ▶ Position anormale du membre,
- ▶ Œdème important,
- ▶ Boiterie,
- ▶ Douleur importante.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ▶ Une bande auto-agrippante,
- ▶ Deux attelles (à défaut : un magazine ou un journal roulé autour de la patte, deux baguettes...),
- ▶ Un antiseptique iodé ou de la chlorhexidine,
- ▶ Des compresses,
- ▶ De la gaze ou un linge propre.



LES BONNS GESTES



Si besoin, mettez une muselière : si la douleur est trop forte, le chien peut avoir des réactions inattendues.

Fracture ouverte :

- ▶ Aspergez généreusement la plaie avec l'antiseptique iodé ou la chlorhexidine,
- ▶ Disposez des compresses stériles sur la plaie de manière à couvrir entièrement les lésions,
- ▶ Ajoutez un linge ou de la gaze pour protéger la plaie avant la pose des attelles (une de chaque côté du membre).

Fracture simple :

- ▶ Posez l'attelle le long du membre cassé : elle doit couvrir toute la zone de la fracture et s'étendre au-delà des articulations, au-dessus et en dessous,
- ▶ Maintenez l'attelle avec une bande sans trop serrer : laissez la place de passer un doigt ou deux. Le pansement ne doit pas descendre.



Sur la patte avant : on peut fixer l'attelle en position assise ou debout.

Sur la patte arrière : il est mieux de la positionner sur le chien debout.



TRANSPORT / DÉPLACEMENT

- ▶ Si vous êtes loin de la voiture, il faut porter le chien pour éviter que la fracture ne s'aggrave.
- ▶ S'il est trop lourd, il faut l'aider à se déplacer en le soulageant de son poids :
enroulez un pull, une veste ou un linge autour de son abdomen en maintenant les extrémités par-dessus son dos, comme un harnais.
- ▶ Une fois dans le véhicule, allongez le chien avec sa patte blessée relevée. Immobilisez-le et si besoin restez à côté de lui.



LES GESTES À ÉVITER !

- ▶ Essayer de redresser l'os si la fracture est visible.





SYMPTÔMES / DESCRIPTION

- ▶ Ce type de morsure laisse deux points rouges, plus ou moins espacés de 0,5 à 1 cm (pas toujours visibles).



- ▶ La zone peut aussi se mettre à enfler, parfois 20 à 30 minutes après la morsure.
- ▶ Localement, on observe un œdème, une hémorragie, une nécrose, une douleur très importante.
- ▶ La morsure peut entraîner une boiterie ainsi qu'une réaction ganglionnaire (les ganglions localisés à proximité de la zone mordue augmentent de taille).
- ▶ Des symptômes généraux peuvent apparaître entre 30 minutes et 3 heures après la morsure, tels que : fièvre, diarrhée, vomissements, troubles cardiorespiratoires, hypotension, convulsions, paralysie...



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ▶ Une bande,
- ▶ Une poche de froid instantané,
- ▶ De l'antiseptique.



LES BONS GESTES

- ▶ Nettoyez la morsure avec un antiseptique (pas d'alcool),
- ▶ Appliquez du froid sur la morsure (poche de froid instantané ou, à défaut, compresse froide) pour limiter la douleur et la diffusion du venin,
- ▶ En cas de morsure à un membre, faites un bandage légèrement compressif pour ralentir la diffusion et l'apparition d'un œdème.



LES GESTES À ÉVITER !

- ▶ Laisser le chien bouger : l'accélération du rythme cardiaque favorise la diffusion du venin,
- ▶ Inciser la morsure,
- ▶ Tenter d'aspirer le venin,
- ▶ Utiliser de l'alcool : favorise la diffusion du venin !





SYMPTÔMES / DESCRIPTION

- ▶ Lésion de la peau plus ou moins profonde, entaille, sans lésion des tissus ou vaisseaux sous-jacents.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ▶ Une paire de ciseaux,
- ▶ Des compresses,
- ▶ Une solution lavante (savon liquide...),
- ▶ Un antiseptique iodé ou de la chlorhexidine,
- ▶ Une bande auto-agrippante,
- ▶ Une pince pour poser des agrafes lors de petites plaies.





LES BONS GESTES

- ▶ Coupez les poils aux ciseaux pour dégager la plaie,
- ▶ Nettoyez à l'aide d'une compresse : frottez doucement pour éliminer les saletés et les corps étrangers qui pourraient se trouver dans la plaie. Utilisez éventuellement de l'eau et du savon,
- ▶ Une fois la plaie bien dégagée et lavée, désinfectez avec l'antiseptique iodé ou la chlorhexidine,
- ▶ Appliquez un pansement, maintenu à l'aide d'une bande suivant la localisation de la plaie. Le mieux reste de laisser la plaie à l'air,
- ▶ En cas de plaie légère, posez des agrafes,
- ▶ Posez une collerette.



En cas de pose d'agrafes ou de suture par un vétérinaire, il faut toujours protéger la plaie pendant 10 jours à l'aide d'un pansement ou d'un carcan, afin que le chien ne puisse ni se lécher ni se gratter.



LES GESTES À ÉVITER !

- ▶ Utiliser de l'alcool : brûle les tissus et empêche la cicatrisation.
- ▶ Laisser le chien se lécher : risque d'infection !





SYMPTÔMES / DESCRIPTION

- ▶ Perte de sang abondante et continue, qui peut menacer, à très court terme, la vie de l'animal.




MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ▶ Des compresses,
- ▶ Une bande auto-agrippante et/ou du sparadrap,
- ▶ Un morceau de tissu propre (type serviette).



LES BONS GESTES

- ▶ Une compression locale doit être pratiquée le plus rapidement possible. Cela va permettre de comprimer les vaisseaux sanguins et d'arrêter l'hémorragie.
- ▶ Deux techniques sont possibles : par compression directe ou par pansement compressif.



LA COMPRESSION DIRECTE

- ▶ Appuyez fortement à la base du saignement directement sur la plaie. La compression doit se faire avec les doigts ou avec la paume de la main,
- ▶ Pour réaliser ce geste efficacement, interposez entre la plaie et la main une épaisseur grâce à un tissu propre qui recouvre complètement la plaie,
- ▶ Si vous n'avez pas de quoi recouvrir la plaie, appuyez directement avec votre main tout en la protégeant (gants, poche en plastique...).

LA COMPRESSION PAR PANSEMENT COMPRESSIF

- ▶ Cette technique est très avantageuse pour le secouriste car elle permet de garder les mains libres.
- ▶ Le pansement compressif consiste à remplacer la compression manuelle par un tissu épais et propre recouvrant entièrement la plaie, fixé à l'aide d'une bande élastique ou d'un lien large assez long pour serrer suffisamment afin de stopper le saignement.



Vérifiez que l'animal garde toutes ses fonctions vitales : muqueuses roses, respiration régulière.

LE GARROT

C'est un geste de secourisme qui ne peut pas s'appliquer à tous les types de saignements. En effet, il est uniquement adapté aux hémorragies massives.

De plus, cette technique doit être réalisée dans le cas où la compression directe est inefficace ou impossible à effectuer à cause de la présence d'un corps étranger.

Un garrot ne peut être posé qu'aux membres et à la queue afin de comprimer les vaisseaux de manière efficace.

Même si cette technique est adaptée pour les hémorragies, elle présente également quelques contraintes pour l'animal :



- ▶ Le garrot stoppe totalement la circulation sanguine dans le membre concerné.
- ▶ Le garrot doit rester en place le moins longtemps possible.
- ▶ Le garrot ne peut être retiré que par un vétérinaire.

Notez l'heure de pose du garrot, cette information sera nécessaire au vétérinaire.



SYMPTÔMES / DESCRIPTION

- ▶ Perforation (parfois très petite) au niveau de la poitrine, du thorax,
- ▶ Souffle plus ou moins important sortant de la plaie.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ▶ Des compresses,
- ▶ Un antiseptique iodé ou de la chlorhexidine,
- ▶ Une bande auto-agrippante,
- ▶ Une couverture de survie.





LES BONS GESTES

- ▶ Nettoyez la plaie avec du désinfectant et une compresse,
- ▶ Mettez des compresses sur la plaie pour « boucher le trou »,
- ▶ Entourez le thorax d'une bande ou d'un linge : ne serrez pas trop fort pour ne pas provoquer de douleur supplémentaire notamment en cas de côte cassée,
- ▶ Couchez le chien du côté de la plaie pour limiter les « fuites d'air »,
- ▶ Maintenez le chien au chaud à l'aide d'une couverture de survie.

**APPELEZ
D'URGENCE VOTRE
VÉTÉRINAIRE
N'ATTENDEZ PAS !**



LES GESTES À ÉVITER !

- ▶ Attendre : il est impératif d'agir et de contacter le vétérinaire au plus vite !
- ▶ Donner à boire ou à manger au chien.



PROBLÈME OCULAIRE

L'œil est un organe qui reste fragile et qui peut avoir des séquelles importantes en cas de blessure.

En cas d'atteinte oculaire sur un animal, il vous faudra agir dès que possible car ce type d'urgence peut provoquer une cécité totale.



SYMPTÔMES / DESCRIPTION

- ▶ Douleur sur la zone touchée,
- ▶ Fermeture ou clignement de la paupière,
- ▶ Le chien se frotte l'œil contre le sol ou avec la patte,
- ▶ Intolérance à la lumière,
- ▶ Rougeur au niveau de l'œil.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ▶ Des compresses stériles,
- ▶ Du sérum physiologique (à défaut de l'eau claire).



LES BONS GESTES

- ▶ Mettez l'animal à l'abri du vent et de la lumière afin de ne pas occasionner une douleur supplémentaire,
- ▶ Appliquez un pansement avec une compresse stérile imbibée de sérum physiologique si possible (ou rincez à l'eau claire) afin de limiter les risques d'infection,
- ▶ Assurez-vous que le chien ne pourra pas l'enlever jusqu'à l'arrivée chez le vétérinaire,
- ▶ Mettez une collerette au chien afin de l'empêcher de se gratter ou de se frotter.



En effectuant le pansement, couvrez le deuxième œil afin d'éviter les mouvements des globes oculaires.



LES GESTES À ÉVITER !

- ▶ Toucher l'œil avec ses doigts :
risque d'infection !
- ▶ Retirer un corps étranger de l'œil :
risque d'aggravation de la plaie !



TRANSPORTER UN CHIEN BLESSÉ

- ▶ Si celui-ci peut marcher tout seul, privilégiez cette méthode,
- ▶ S'il ne tient pas debout ou boîte fortement, il faudra le porter en faisant bien attention. Evitez bien entendu d'être en contact avec les blessures,
- ▶ Pour porter un chien tout seul, placez une main sous l'abdomen du chien et l'autre sous le cou ou bien reculez chaque main : une derrière les pattes avant, l'autre derrière les genoux.



Un chien blessé est un chien fébrile, en état de choc : pensez toujours à le couvrir à l'aide d'une veste, d'un pull, d'une serviette et à le maintenir au chaud (évittez de le mettre à l'arrière d'un pick up, surtout si votre caisse de transport n'est pas protégée par un hard top).

IMPROVISER UN BRANCARD



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Une veste ou un tissu large 150 x 100 cm.



LA MÉTHODE

- Déposez délicatement le chien dans la veste (pensez à lui mettre une couverture de survie : un animal blessé peut vite faire une hypothermie),
- Fermez la fermeture éclair en prenant soin de laisser la tête du chien à l'intérieur (cela permettra d'éviter des chocs supplémentaires et le calmera pendant le transport),
- Soulevez la veste à deux personnes en tenant chacun une manche et le bas du vêtement.

Attention de ne pas trop serrer le chien !



Faites des pauses sur le trajet et ouvrez la veste pour vérifier la respiration et l'état de l'animal.

IMPROVISER UNE MUSELIÈRE

1



A l'aide de votre laisse, faites un «huit»,

2



Faites ensuite pivoter la partie basse du huit à la rencontre de la partie haute,

3



Enfilez le museau du chien dans le tunnel ainsi formé, les bouts de la laisse sous la gorge,

4



Attachez les 2 bouts de la laisse derrière les oreilles, sur la nuque avec un noeud type ganse de chaussures.

- Pensez, après toute activité, à permettre au chien de bien s'hydrater (boire de l'eau fraîche à plusieurs reprises et en petite quantité) et de se vider avant de le remettre en voiture.



- En cas d'activité intense et prolongée, par forte chaleur, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre vétérinaire qui saura vous conseiller sur les produits adaptés afin d'éviter les crises d'urée.
- Après un traumatisme, une opération, une journée d'efforts... mettez le chien sous une lampe rouge (environ un mètre au dessus de lui) : cela lui permettra un rétablissement plus rapide et lui assurera un confort certain.